果蝇雌性生殖干细胞免疫组织化学染色

Immunohistochemistry for *Drosophila* Female Germline Stem Cells

石静远^{1,2}, 袭荣文^{1,*}

¹北京生命科学研究所, 北京; ²生命科学学院, 北京大学, 北京

*通讯作者邮箱: xirongwen@nibs.ac.cn

引用格式: 石静远, 袭荣文. (2019). 果蝇雌性生殖干细胞免疫组织化学染色. *Bio-101* e1010263. Doi: 10.21769/BioProtoc.1010263.

How to cite: Shi, J. Y. and Xi, R. W. (2019). Immunohistochemistry for *Drosophila* female germline stem cells. *Bio-101* e1010263. Doi: 10.21769/BioProtoc.1010263. (in Chinese)

摘要: 果蝇的生殖干细胞是研究干细胞调控和微环境作用的重要模型。利用果蝇的生殖干细胞模型, 人们首次证明了干细胞的微环境调控学说。而对于果蝇的生殖干细胞, 免疫组织化学是主要的研究手段之一。利用抗原抗体的特异性结合特性, 将特定蛋白用其特异性抗体 (IgG) 标记, 并通过带有荧光基团的抗体结合已标记蛋白上的 IgG, 可以实现组织中特定蛋白质的标记, 从而标记特定表达该蛋白的细胞并用于进一步分析。本文以雌性果蝇的卵巢为对象, 通过抗 α -Spectrin, Vasa 两种抗体, 标记原卵区 (germarium) 的雌性生殖干细胞和其微环境, 以便分析雌性生殖干细胞的干性维持和分化。

关键词: 果蝇, 雌性生殖干细胞, 原卵区, 微环境

材料与试剂

1. 移液枪头
2. 2 ml 离心管
3. 载玻片
4. 盖玻片
5. 雌性成体果蝇
6. 指甲油
7. 37% 甲醛 (formaldehyde, Sigma, catalog number: F1635)
8. NaH_2PO_4
9. Na_2HPO_4

10. NaCl
11. 甘油
12. DABCO (1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octane)
13. Triton™ X-100
14. 羊血清 (NGS)
15. 一抗 (特异性结合目标蛋白): 大鼠抗 Vasa (DSHB, anti-vasa), 小鼠抗 alpha-Spectrin (DSHB, 3A9)
16. 二抗 (带有荧光基团, 特异性结合一抗): Alexa 568 大鼠抗 IgG (Molecular Probes), Alexa 488 小鼠抗 IgG (Molecular Probes)
17. DAPI (4',6'-diamidino-2-phenylindole; Sigma)
18. 磷酸缓冲液 (1× PBS, pH 7.4) (见溶液配方)
19. PBT (1×) (见溶液配方)
20. 封片剂 (见溶液配方)

仪器设备

1. 镊子 (WPI®, Dumoxel 合金镊子, #5 14098)
2. 移液器
3. 解剖板
4. 解剖显微镜 (Leica L2)
5. 摇床
6. 通风橱
7. 荧光显微镜 (Zeiss Meta 510)

实验步骤

一、组织解剖和固定

1. 挑选较年轻的雌性成体果蝇, 用二氧化碳麻醉。
2. 在多孔板中倒入 PBS, 在解剖显微镜下用镊子将卵巢从果蝇腹部取出, 尽可能去除周围的脂肪, 肠道等组织, 加入带有 500 μ l PBS 的 2 ml 离心管中。
3. 在通风橱中加入甲醛至甲醛 4% 的体积比, 放置在摇床上, 在室温下固定 15 分钟

4. 使用移液器在通风橱中尽可能地吸去 4% 甲醛溶液。
5. 使用 PBT 洗去残留的甲醛溶液，洗三次，每次放置在摇床上 5 分钟。

二、免疫组化染色

1. 吸去清洗的 PBT，加入新 300 μ l PBT。
2. 加入羊血清至 5% 体积比，用于封闭。
3. 加入两种一抗，大鼠抗 Vasa (1:200)、小鼠抗 α -Spectrin (1:200) 放在放置在摇床上 4 $^{\circ}$ C 孵育过夜。
4. 使用移液器尽可能多的吸去一抗溶液，并用 PBT 洗去残留的溶液，洗三次，每次放置在摇床上 5 分钟。
5. 吸去清洗的 PBT，加入新的 300 μ l PBT。
6. 加入两种二抗，Alexa568 大鼠抗 IgG (1:300)、Alexa488 小鼠抗 IgG (1:300) 放在摇床上常温避光孵育 2 小时。
7. 使用 PBT 洗去残留的二抗，加入新 300 μ l PBT，并加入 1 μ l DAPI 染色，放置在摇床上，常温避光染色 5 分钟。
8. 使用 PBT 洗三次每次放置在摇床上 5 分钟。
9. 吸去清洗的 PBT，加入 30 μ l 封片剂，放入 4 $^{\circ}$ C 孵育半小时。

三、制片与成像

1. 在解剖显微镜下放置一片载玻片。
2. 用移液器将卵巢和 20 μ l 左右封片剂一起转移至载玻片上。
3. 在镜下用镊子剔去较大的卵细胞，留下卵巢前端，并将其轻轻分开，让卵巢小体 (ovarivole) 分散在载玻片上。
4. 将盖玻片轻压在载玻片上，让封片剂填充满载玻片与盖玻片间空隙，再放上纸巾轻压，使得多余液体挤出并用纸巾吸干。如有液体不足，可用移液器补加适量封片剂，再重复步骤 4。
5. 之后可以用指甲油密封盖玻片边缘，待指甲油晾干后，用荧光显微镜成像观察。

结果与分析

果蝇雌性生殖干细胞位于卵巢前部，原卵区的最前端，由它产生的子细胞经过一系列不完全分裂发育成 16 细胞的包囊细胞，并被卵泡细胞包裹成为卵室并出芽离开原卵区，在后续过程中其 16 个中的一个细胞发育为卵母细胞，其他细胞分化为滋养细胞合成卵黄成分，而滋养细胞本身也在之后分解凋亡，最终仅剩下一个卵细胞，形成成熟的卵。这一系列的生殖细胞系，均可通过 **Vasa** 蛋白的表达特异识别。通过对 **Vasa** 蛋白的免疫组织化学染色，可以明显观察到在原卵区的生殖细胞系的分化进程 (图 1B)。并且 **DAPI** 能够将整个原卵区细胞的染色质染色 (图 1A)。这使得我们通过将 **DAPI** 和 **Vasa** 的染色结果相结合 (图 1A, 1B)，观察到不属于生殖细胞的体细胞类群，而这些体细胞帮助构成了生殖干细胞干性维持和发育的微环境。

在原卵区里，果蝇雌性生殖干细胞收到微环境提供的 **Dpp** 信号调控，抑制生殖细胞分化所需的 **Bam** 基因表达，维持干细胞干性。而干细胞一旦离开提供 **Dpp** 信号的环境，**Bam** 基因的抑制解除，从而促使果蝇雌性生殖干细胞分化。而后续分化过程中，生殖细胞特征的细胞器结构 **spectrosome** 也会随之变化。生殖干细胞中的 **spectrosome** 常呈球形或棒状结构，细胞分裂后形成融合体 (**fusome**) 联通 16 细胞，帮助这其中的物质运输和卵母细胞形成 (Song 等, 2004)。而 **spectrosome** 中包含的 α -**Spectrin** 蛋白可以作为标记追踪 **spectrosome** 及之后的融合体的形态 (图 1C)，并帮助观察果蝇雌性生殖干细胞的后续分化过程 (Lin 和 Spradling, 1995)。

除了正常免疫染色信号以外，免疫染色有时也会染上一些杂质，影响结果。在原卵区免疫染色中，有时会残留有附着原卵区的结构，例如鞘细胞。这些细胞很容易附着上抗体，造成假阳性的免疫荧光信号，需要注意区别，尽量选择特异性好的抗体。

图 1. 果蝇卵巢原卵区免疫组化染色结果. A. DAPI 染色细胞核; B. Vasa 蛋白免疫组化染色, 结合的是 Alexa 488 小鼠抗 IgG; C. α -Spectrin 蛋白免疫组化染色, 结合的是 Alexa568 大鼠抗 IgG; D. 各个通道染色结果叠加图像。

注意事项

一、荧光信号弱或无信号

1. 一抗与二抗不匹配

选用与一抗来源物种对应的二抗

2. 一抗或二抗浓度过低

适当增加抗体浓度

3. 抗体存储不当或污染导致失效

及时替换新抗体

4. 样品量过多

减少每管的样品量, 每管尽量不超过 5 对卵巢

5. 样品在固定前放置时间过长

可以将解剖后组织浸泡在 PBS 中并插在冰上暂时保持一段时间 (不超过 3 小时) 至样品固定前

二、背景信号过强或非特异性识别

1. 一抗或二抗浓度过高

适当降低抗体浓度

2. 孵育一抗或二抗后，未洗净多余抗体
增加洗涤次数
3. 羊血清出现沉淀或变质，导致封闭效果不佳
换用新的羊血清
4. 制片后长时间未进行成像
制片后尽快进行成像，或者放到-20 °C 保存

溶液配方

1. 磷酸缓冲液 (1× PBS, pH 7.4)
10 mM NaH₂PO₄/Na₂HPO₄
175 mM NaCl
2. PBT (1×)
1× PBS
0.1% Triton™ X-100
3. 封片剂
70%甘油
2% DABCO
28% 1× PBS (v/v)

致谢

本文实验方案改编自发表文章 Li 等 (2010) 和 (2016)。

参考文献

1. Li, X., Han, Y. and Xi, R. (2010). [Polycomb group genes *Psc* and *Su\(z\)2* restrict follicle stem cell self-renewal and extrusion by controlling canonical and noncanonical Wnt signaling.](#) *Genes Dev* 24(9): 933-946.
2. Li, X., Yang, F., Chen, H., Deng, B., Li, X. and Xi, R. (2016). [Control of germline stem cell differentiation by Polycomb and Trithorax group genes in the niche microenvironment.](#) *Development* 143(19): 3449-3458.
3. Lin, H. and Spradling, A. C. (1995). [Fusome asymmetry and oocyte determination in *Drosophila*.](#) *Dev Genet* 16(1): 6-12.

4. Song, X., Wong, M. D., Kawase, E., Xi, R., Ding, B. C., McCarthy, J. J. and Xie, T. (2004). [Bmp signals from niche cells directly repress transcription of a differentiation-promoting gene, bag of marbles, in germline stem cells in the *Drosophila* ovary.](#) *Development* 131(6): 1353-1364.